



BLAASMETING URODYNAMISCH ONDERZOEK

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over blaasmeting urodynamisch onderzoek. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

Doel van het onderzoek

U bent onder behandeling wegens klachten over ongewild urineverlies. Om de oorzaak daarvan vast te stellen, is het nodig om een blaasmeting te verrichten. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de reactie van de blaasspier op toenemende vulling van de blaas en tevens wordt informatie verkregen over het sluitmechanisme van de blaas. Ook kan de werking van de spieren van de bekkenbodem gemeten worden.

Vorbereiding

Voor het onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen noodzakelijk.

Het onderzoek

Voor het ondergaan van het onderzoek krijgt u schriftelijk of telefonisch bericht thuis. Op het afgesproken tijdstip kunt u plaatsnemen bij poli gynaecologie, route nummer 67. Graag melden bij de balie. De verpleegkundige komt u hier halen.

De behandeling

Er wordt een slangetje in de blaas gebracht om de blaas met steriel water te vullen. Via dat slangetje kan tegelijk de druk in de blaas en de druk in de plasbuis worden gemeten. Tevens wordt er een dun slangetje in de schede (vagina) gebracht om de druk in de buik te meten. Met een aantal plakkers naast de anus kan zo nodig ook de werking van de spieren van bekkenbodem worden geregistreerd.

Vóór het inbrengen van de slangetjes wordt het gebied rond de schede en de uitwendige urinebuis met water schoongemaakt. Tevens wordt dan eventuele resturine uit de blaas verwijderd. Het inbrengen van de meetslangetjes is hooguit wat prikkelend, echter niet pijnlijk.

Na het vastplakken van de slangetjes wordt de blaas met een bepaalde snelheid gevuld en worden de drukveranderingen en reacties van de blaas automatisch geregistreerd. Tijdens deze fase wordt u gevraagd precies aan te geven wat u voelt. Dit gevoel kan variëren van lichte aandrang om te plassen tot onhoudbare aandrang.

U hoeft tijdens het onderzoek de urine niet op te houden en als de vulling van de blaas pijnlijk wordt, wordt het onderzoek gestaakt.

Na afsluiten van het onderzoek plast u leeg in een speciale trechter waardoor de sterkte van de plasstraal kan worden gemeten.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 20 minuten.

Complicaties

Bij dit onderzoek treden zelden complicaties op.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u door het inbrengen van de slangetjes lichte irritatie in blaas of plasbuis krijgen. Om dit te voorkomen of te verhelpen is het verstandig om na het onderzoek ruim te drinken. Het slikken van antibiotica is niet nodig.

Uitslag

Voor dat u naar huis gaat krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Tijdens deze afspraak bespreekt de gynaecoloog zijn bevindingen.

Tot slot*Inzien medische gegevens*

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.

Bereikbaarheid polikliniek Gynaecologie

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met polikliniek Gynaecologie via 0181-65 83 80.

Raadpleeg onze website voor de actuele tijden.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.