

## EVLT BEHANDELING

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over een EVLT behandeling van de beenaderen. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

Naar aanleiding van de resultaten van het duplex onderzoek en het intake gesprek is in overleg met u besloten een EVLT behandeling uit te voeren. De specialist voert de behandeling uit. Wij adviseren u om een uur voor de behandeling 2 stuks paracetamol van 500 mg in te nemen.

### Wat gebeurt er tijdens de behandeling?


De behandeling is poliklinisch en u hoeft niet nuchter te zijn. Na de behandeling mag u direct naar huis. In het te behandelen gedeelte wordt een katheter geplaatst. Met een echo-apparaat wordt vervolgens de juiste positie van de katheter bepaald. Daarna wordt het te behandelen gedeelte van de spatader lokaal verdoofd met kleine prikken. Bij de EVLT behandeling geeft de tip van de katheter laserenergie af. De katheter in de ader wordt nu voorzichtig teruggetrokken. Tijdens het terugtrekken van de katheter\* wordt de wand van het bloedvat verhit en sluit deze zodat het bloedvat als het ware wordt afgebroken door het lichaam.



*\*Terugtrekken van de katheter in de ader*

### Na de ingreep

Patiënten die de behandeling ondergaan, konden meestal hun dagelijkse activiteiten na 1 dag hervatten, tenzij zij een beroep hebben waarbij zij veel moeten staan of zitten en zwaar moeten tillen. Dan is het raadzaam om de 1<sup>e</sup> week rustig aan te doen. Na de ingreep moet u gedurende 2 dagen (dag en nacht) een aangemeten steun-/verbandkous dragen. U mag de 1<sup>e</sup> 48 uur niet douchen. Ga regelmatig lopen en/of fietsen, maar vermijd langdurig staan en zware lichamelijke inspanning zo veel mogelijk.



## Zijn er bijwerkingen?

Direct na de behandeling gaat de ader krimpen, wat voelbaar kan zijn. Op de behandelde plek kan een bloeduitstorting ontstaan. Verder kan het de behandelde plek er rood uitzien en warm aanvoelen. Bij hevige klachten en bij koorts neemt u contact op met de polikliniek die de ingreep heeft uitgevoerd. Dit is de polikliniek Chirurgie of Dermatologie.

De dichtgemaakte ader kan donker gekleurd zijn en soms voelbaar zijn als een harde streng of harde stukjes. Dit verdwijnt na ongeveer 3 maanden. Neem indien nodig paracetamol of diclofenac.

Na 2 à 3 maanden na de ingreep komt u terug voor controle. Over het algemeen nemen de zichtbare spataderen binnen 3 maanden af. Resterende spataderen kunnen later behandeld worden.

## Aanvullende behandelingen

Voor het beste cosmetische resultaat kunt u besluiten om na de procedure in overleg met de arts een aanvullende behandeling uit te laten voeren. Zoals bijvoorbeeld met scleroseren of lasertherapie. Het resultaat is mooiere benen en minder klachten. Dit is meestal niet vergoede zorg.

## Tot slot

### *Inzien medische gegevens*

Op [mijn.spijkenissemc.nl](http://mijn.spijkenissemc.nl) kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website [www.spijkenissemc.nl](http://www.spijkenissemc.nl).

### *Vergoeding ziekenhuiszorg*

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op [www.dezorgnota.nl](http://www.dezorgnota.nl)

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met de poli Chirurgie via 0181-65 84 21 of poli Dermatologie via 0181 – 65 83 60.

Raadpleeg onze website voor de actuele tijden.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.