



# OPERATIE AAN DE BALZAK - ORCHIDOPEXIE

**Uw kind komt binnenkort in ons ziekenhuis voor een operatie aan de balzak. De uroloog of chirurg heeft u en uw kind verteld over de behandeling. In deze folder kunt u de informatie nalezen.**

## **Doel van de ingreep**

Deze operatie is nodig omdat uw zoon een niet ingedaalde zaadbal heeft die in de balzak geplaatst moet worden. De zaadballen ontwikkelen zich bij jongens voor de geboorte en zitten dan nog in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte dalen de zaadballen naar de balzak, na de geboorte zitten beide zaadballen dan ook in de balzak. Een enkele keer komt het voor dat deze indaling niet plaatsvindt. Dit kan bij een bal, maar ook bij beide zaadballen zijn. Op latere leeftijd kan dit problemen bij de vruchtbaarheid geven.

## **De operatie**

De operatie gebeurt onder algehele narcose. Dit betekent dat uw kind tijdens de operatie slaapt. De ingreep duurt ongeveer een uur. Er wordt een sneetje gemaakt in de lies en in de balzak. De zaadbal wordt vrijgemaakt en naar de balzak gebracht. De bal wordt hier vastgezet. Soms kan het zijn dat er tijdens deze operatie ook een liesbreuk wordt ontdekt. Deze wordt dan ook gelijktijdig door de arts verholpen. De wondjes worden meestal met oplosbare hechtingen gehecht.

## **Preoperatieve screening**

Voorafgaand aan de ingreep doorloopt u met uw kind een pre-operatief screeningstraject via de afdeling Intake. U heeft gesprekken met een medewerker van de afdeling Intake, de anesthesioloog (degene die uw kind onder narcose brengt op de operatiekamer) en de ziekenhuisapotheker. Indien uw kind medicijnen gebruikt dient u dit aan te geven aan de anesthesioloog of uw behandelend arts.

Een week vóór de ingreep mag uw kind geen aspirineachtige pijnstillers (aspirine, aspro, ascal) gebruiken omdat deze het bloed verdunnen en de bloedstolling beïnvloeden. Het gebruik van paracetamol is wel toegestaan.

## **Kindervoorbereiding bij de medisch pedagogisch medewerker**

Samen met uw kind ouder dan 4 jaar, verwacht de medisch pedagogisch medewerker u op donderdagmiddag op het voorbereidingspreekuur. Hier krijgen u en uw kind praktische informatie, afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind over de opnamedag.

Indien uw kind in de leeftijd is van 1,5 tot 5 jaar, krijgt u instructies van de medisch pedagogisch medewerker en eventueel een voorbereidingskoffer mee naar huis, waarmee u in eigen vertrouwde omgeving samen met uw kind kunt oefenen.

De afspraak hiervoor maakt u **zelf** via de afdeling Opname, telefoonnummer: (0181) 65 88 92.

Vertel uw kind dat het naar het ziekenhuis gaat en vertel eerlijk wat er gaat gebeuren. Ook jonge kinderen begrijpen al heel goed dat er iets te gebeuren staat.

### **Nuchter**

Wij hanteren de volgende richtlijnen bij het nuchter zijn op de operatiedag. Wanneer men zich niet aan deze richtlijnen heeft gehouden verzoeken wij u dit altijd te melden aan de verpleegkundige in verband met de veiligheid van uw kind tijdens de narcose.

### *Nuchterbeleid*

Tot 6 uur voor opnametijd > vast voedsel.  
Tot 2 uur voor opnametijd > alleen water.  
(*dus om 7.00 uur op de afdeling zijn is om 5.00 nog voor het laatst nog wat drinken*).

### **De dag van de ingreep**

U wordt samen met uw kind op de afgesproken datum en tijd verwacht op de Kinderdagbehandeling. Als uw kind op de dag van de ingreep ziek is of koorts heeft (hoger dan 38°C), vragen wij u contact op te nemen met de Kinderdagbehandeling, via (0181) 65 82 10. Vanaf 7.00 uur is de kinderverpleegkundige aanwezig. Meestal dient de ingreep dan te worden uitgesteld.

### *Wat neemt u mee?*

- Medicijnen
- Legitimatie
- Verzekeringsbewijs
- Lievalingsknuffel
- Schone kleding/pyjama
- Schone handdoek
- Schone luier

### *Zindelijk*

Als uw kind 's nachts nog niet zindelijk is kan het zijn dat het tijdens de narcose in de broek plast. Daarom is het fijn wanneer uw kind tijdens de ingreep een luier draagt.

### *Bezoek*

In verband met de rust op de Kinderdagbehandeling zijn broertjes/zusjes en overig bezoek niet toegestaan. Wij hanteren de regel van 2 personen per kind.

### **De narcose**

De ingreep vindt plaats onder algehele narcose. U heeft met de anesthesioloog afgesproken of uw kind onder narcose wordt gebracht met een kapje of een prikje. Eén ouder mag tijdens de toediening van de narcose bij het kind zijn. Zodra de ingreep klaar is wordt u door de verpleegkundige opgehaald en bij uw kind in de uitslaapkamer gebracht.

**Wij adviseren zwangere vrouwen om niet bij de inleiding van de narcose aanwezig te zijn. Zorg er in dit geval voor dat een vertrouwd persoon uw plaats kan innemen.**

Als uw kind onder narcose is, wordt een infuus aangebracht. Het infuus moet blijven zitten tot uw kind met ontslag gaat.

## Op de afdeling

Als uw kind goed wakker is komt de kinderverpleegkundige van de afdeling u en uw kind weer halen van de uitslaapkamer. Op de afdeling mag uw kind weer eten en drinken. Uw kind moet voordat het naar huis mag wel geplast hebben.

## Weer thuis

Soms is het gebruik van pijnstillers nodig. U kunt een Paracetamol tablet, kauwtablet, Paracetamol drank of zetpil geven volgens onderstaand schema:

| Kilogram      | Hoevaak per dag | Dosering |
|---------------|-----------------|----------|
| 7 – 9 kg      | 3 x daags       | 240 mg   |
| 10 – 14 kg    | 4 x daags       | 240 mg   |
| 15 – 19 kg    | 3 x daags       | 500 mg   |
| 20 – 29 kg    | 4 x daags       | 500 mg   |
| 30 – 39 kg    | 3 x daags       | 1000 mg  |
| 40 kg of meer | 4 x daags       | 1000 mg  |

## Leefregels en adviezen

- Mobiliseren naar kunnen.
- De steristrips (kleine hechtpleisters) laten zitten totdat ze er zelf afkomen.
- Oplosbare hechtingen, ook op de balzak, laten zitten.
- Vaak plaatsen we ook een doorzichtige pleister die voorkomt dat de wond nat wordt. Deze laten zitten.
- Kind mag 1 week niet zwemmen, in bad, fietsen, sporten.
- Douchen mag weer 24 uur na operatie.
- Bij het dragen van luiers, de luiers wat vaker verschonen.
- U krijgt een polikliniek controle op afspraak.

## Mogelijke complicaties

- Er kan een nabloeding optreden. Dit is meestal te zien als een bloed-

uitstorting onder de hechting. Deze verdwijnt meestal vanzelf.

- Er kan een infectie optreden. Let op roodheid, warmte en zwelling van de wond.
- De balzak kan wat rood en gezwollen zijn na de ingreep.
- Koorts > 38,5° C dan even contact opnemen.

Wanneer de ingreep is uitgevoerd door de uroloog, neemt u dan contact op met de medewerkers van de polikliniek Urologie. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer (0181) 65 83 88. Wanneer de ingreep is uitgevoerd door de chirurg, neemt u dan contact op met de medewerkers van de polikliniek Chirurgie. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer (0181) 65 83 88. Op andere dagen en tijden kunt u contact opnemen met de medewerkers van de receptie van Spijkenisse Medisch Centrum op telefoonnummer (0181) 65 88 88.

## Kosten ziekenhuiszorg

Wij maken u er op attent, dat vergoeding van de kosten voor onderzoek of behandeling in Spijkenisse Medisch Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre de kosten voor u worden vergoed.

Meer informatie leest u in de folder 'Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?' op [www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht](http://www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht) > item Algemeen en die tevens verkrijgbaar is bij de medewerkers van het ziekenhuis.

Kijk ook eens op [www.dezorgnota.nl](http://www.dezorgnota.nl). Deze website biedt informatie over de zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde vragen en geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt. heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre de kosten voor u worden vergoed.

Meer informatie leest u in de folder '*Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?*' op [www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht](http://www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht) > item Algemeen en die tevens verkrijgbaar is bij de medewerkers van het ziekenhuis.