



Botoxinjecties in de blaaswand

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over botoxinjecties in de blaaswand. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

Wat is een overactieve blaas

De blaas dient als opslag voor urine en zorgt voor het uitplassen van urine. Het eerste gebeurt door het ontspannen van de blaas en het tweede door het samen knijpen van de blaas. Als het ontspannen onvoldoende gebeurt en de blaas voornamelijk bezig is met aanspannen, dan laat deze zich onvoldoende vullen en dan spreken we over een overactieve blaas.

Behandeling met botox

Botox is een afkorting voor Botuline Toxine, een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt. Als botox in de blaasspier wordt gespoten, wordt de signaaloverdracht van de zenuwuiteinden naar de blaasspier geblokkeerd. Hierdoor neemt het samentrekken van de blaas af. Ook gevoelszenuwen vanuit de blaas worden geblokkeerd, waardoor het gevoel van aandrang om te plassen vermindert. U hoeft dus minder vaak te plassen.

Botox werkt zes tot twaalf maanden en de injecties kunnen zonder schadelijke gevolgen voor de blaas worden herhaald.

Vorbereiding op de behandeling

Het injecteren van botox in de blaasspier kan pijnlijk zijn. Een behandeling met botoxinjecties in de blaaswand kan plaatsvinden onder lokale verdoving op de polikliniek Urologie of onder algehele narcose in de operatiekamer. Uw behandelend arts bespreekt met u op welke manier en plaats de behandeling bij u plaatsvindt.

Wij adviseren u niet knellende en makkelijk zittende kleding te dragen en geen sieraden te dragen en/of waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis.

Behandeling op de polikliniek Urologie

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving en u hoeft niet nuchter te zijn. Als u de eerste keer voor behandeling komt, wordt u opgenomen op de dagverpleging. De verpleegkundige brengt u naar de polikliniek Urologie.

Voorafgaand aan de behandeling krijgt u pijnstillende medicatie in uw blaas toegediend. Via een katheter wordt uw blaas gelegeerd en wordt de verdovingsvloeistof ingebracht. Ongeveer dertig minuten na het toedienen van de vloeistof, vindt de behandeling plaats.

Behandeling op de operatiekamer

Ter voorbereiding doorloopt u een pre-operatief screeningstraject via de afdeling Intake. U heeft gesprekken met een medewerker van de afdeling Intake, de anesthesioloog en, als u ook medicatie gebruikt, met de ziekenhuisapotheeker.

Behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met uw benen in beensteunen. Uw behandelend arts brengt een hol buisje via uw plasbuis in de blaas. Op dit buisje is een kleine camera aangesloten, zodat er in uw blaas gekeken kan worden. Door -via het buisje- water in de blaas te brengen, wordt de blaas tot ontplooiing gebracht. Vervolgens wordt op tien tot twintig plaatsen met een injectienaald een kleine hoeveelheid botox in de blaasspier gespoten. Aan het einde van de behandeling wordt soms een blaaskatheter ingebracht om de urine af te voeren. De behandeling duurt gemiddeld twintig minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de dagverpleging gebracht. Als u voldoende hersteld bent van de verdoving, zelf heeft geplast en zich geen complicaties voordoen, mag u naar huis. Voordat u naar huis gaat controleert de verpleegkundige met een echoapparaat of uw blaas leeg is.

De behandeling heeft plaatsgevonden onder verdoving. U mag daarom alleen onder begeleiding naar huis en niet zelf een voertuig besturen.

Nazorgregels

De effecten van de behandeling zijn na ongeveer drie dagen merkbaar. De eerste dagen na de behandeling kan nog wat bloed in de urine aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk dat u ongeveer twee liter per dag drinkt.

Controle

Voordat u naar huis gaat krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Met uw behandelend arts bespreekt u dan de resultaten van de behandeling.



Complicaties

Bij iedere behandeling kunnen complicaties voorkomen. Het is belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent, zodat u op tijd contact kunt opnemen met uw behandelend arts.

De kans op complicaties neemt toe bij het gebruik van bloedverdunners. Houdt u zich altijd aan de voorschriften van uw behandelend arts.

De effecten van een behandeling met botox kunnen individueel verschillen. Het resultaat van het inspuiten van botox in de blaasspier kan soms zodanig groot zijn, dat het moeilijk is de blaas leeg te plassen. Als er veel urine achterblijft of als u helemaal niet meer kunt plassen, moet u de blaas (tijdelijk) via zelf katheteriseren leeg te maken. Dit komt echter zelden voor en gaat meestal vanzelf over naarmate de botox uitgewerkt raakt.

Om blaasontsteking te voorkomen, heeft u voor de behandeling een recept voor antibiotica ontvangen, die u bij eigen apotheek kunt ophalen.

Wanneer neemt u contact op?

- als u plotseling hevige buikpijn of aanhoudende buikpijn heeft, die zonder pijnstilling niet verdwijnt (paracetamol, maximaal 4x daags 2 tabletten van 500 mg).
- als u hevig bloedverlies heeft en/of grote bloedstolsels uit plast.
- als u plotseling niet meer kunt plassen of het gevoel heeft niet goed te kunnen uitplassen.
- als u enkele dagen na de behandeling meer dan 38,5°C koorts heeft.

Tot slot

Inzien medische gegevens

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met polikliniek Urologie. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur via 0181-65 83 89.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.