



BEHANDELING MET METHYLPREDNISOLON

Binnenkort wordt u opgenomen in het Spijkenisse Medisch Centrum voor een Methylprednisolon behandeling. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

Wat is een Methylprednisolon behandeling

De hooggedoseerde Methylprednisolon behandeling is een therapie voor de behandeling van aanvallen bij MS-patiënten. Een Methylprednisolon behandeling is een infuuskuur, met 500 mg of 1000 mg Methylprednisolon (Prednison). Methylprednisolon is een corticosteroïde. Dit zijn medicijnen die werken als bijnierschors hormonen. Deze medicijnen worden gebruikt om ontstekingen in het lichaam af te remmen en het immuunsysteem bij te sturen. Methylprednisolon remt de ontstekingsreactie in het centraal zenuwstelsel. De aanval wordt zo bestreden en de duur ervan verkort.

Bijwerkingen

Van Methylprednisolon zijn een aantal bijwerkingen bekend die bij een langdurig gebruik van dit middel voorkomen (zoals botontkalking en een opgezet gelaat). Omdat de infuuskuur Methylprednisolon van korte duur en incidenteel is, zijn de bijwerkingen van een kuur gering en van voorbijgaande aard. Hierdoor is het ook mogelijk om de kuur te herhalen. Dat kan nodig zijn bij nieuw ontstane klachten maar ook bij toename van al bestaande klachten.

Vorbereiding

- Wilt u de medicatie die u thuis gebruikt, meenemen.
- Maakt u thuis gebruik van speciale hulpmiddelen neem die dan mee naar
- het ziekenhuis.

De behandeling

De kuur duurt drie of vijf dagen. Na de medicatie-toediening gaat u naar huis. Voordat u de medicijnen krijgt toegediend verricht de verpleegkundige nog enkele controles, zoals:

- de temperatuur, de bloeddruk, de hartslag en uw gewicht. Gedurende de dagen van de kuur, kan de bloeddruk wat verhoogd zijn.
- op de derde dag wordt het glucose(=suiker) gehalte geprikt. Nadat het infuus is ingebracht, kunnen de medicijnen worden toegediend via een infuuslijn. Het duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur voordat de totale hoeveelheid vloeistof via het infuus is toegediend. De ervaring leert dat het voor u prettig kan zijn, om gedurende deze periode op bed te liggen. Mogelijke verschijnselen die u kunt bemerken bij het inlopen van het infuus zijn:
 - een metaalsmaak in de mond (die ook weer verdwijnt zodra de medicijnen zijn ingelopen)
 - misselijkheid

- maagklachten
- rood gelaat
- een opgejaagd gevoel

Na afloop van de kuur verdwijnen deze verschijnselen weer. Indien u last ondervindt van deze verschijnselen geef dit dan door aan de verpleegkundige, zij/hij kan indien nodig contact leggen met de neuroloog. Als alle medicijnen zijn ingelopen en het infuussysteem is doorgespoeld, wordt het infuussysteem afgekoppeld. Hierna krijgt u via de infuusnaald een zoutoplossing (NaCl 0,9%) toegediend zodat de infuusnaald niet verstopt raakt. U gaat met de infuusnaald naar huis.

Na de behandeling

Wanneer de gehele kuur achter de rug is, kunt u met ontslag. Na een tot twee maanden krijgt u een controleafspraak bij de neuroloog.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de polikliniek Neurologie op 0181 65 83 70.

Heeft u nog vragen of wilt u contact opnemen ?

Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie via 0181 65 83 70 (ma t/m vr 08.00 – 16.30 uur).

Bel bij spoed naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) op telefoonnummer 0181 65 8777 (ma t/m van 7.00 tot 21.00 uur), buiten deze tijden kunt u contact opnemen met 0181 65 88 88.

U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost (HAP).
Huisartsenpost Rijmond: 0181 62 70 55

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op onze website.