



# ECTROPION/ ENTROPION

**Door middel van deze folder wil het Spijkenisse Medisch Centrum u informeren over wat een ectropion en een entropion is en hoe u zich kunt voorbereiden op (een eventuele) operatie. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.**

## **Wat is een ectropion**

Een ectropion is een naar buiten gedraaid onderooglid.

Als u ouder wordt, verslapt het onderooglid in horizontale richting. Hierdoor kan het lager gaan hangen en naar buiten kantelen. Dit kan ook veroorzaakt worden door littekens of huidziekten. Een naar buiten gedraaid ooglid veroorzaakt irritatie van het oog, tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind.

## **Wat is een entropion**

Een entropion is een naar binnen gedraaid onderooglid.

Ook deze afwijking is meestal het gevolg van veroudering. De wimpers en de huid van het ooglid wrijven hierdoor tegen het oog. Dit veroorzaakt een rood geïrriteerd oog, dat gevoelig is voor licht en wind. Wanneer het entropion niet wordt geopereerd, is er een risico dat het hoornvlies beschadigt door het schuren van de ooglidhaartjes.

## **Vorbereiding op de operatie**

Voor de operatie wordt u gevraagd of u verder gezond bent, al eerder operaties heeft ondergaan en welke geneesmiddelen u gebruikt. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt,

moet het gebruik hiervan zeker een week voor de operatie gestaakt worden in overleg met de voorschrijvende arts. De operatie gebeurt in de behandelkamer op de polikliniek Oogheelkunde. U kunt na de ingreep zelf geen auto besturen. U wordt geadviseerd om vooraf te regelen dat u door iemand (gebracht en) gehaald wordt.

## **De operatie**

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De oogarts geeft u enkele injecties om de huid te verdoven. Vervolgens maakt de arts een sneetje (incisie) in de huid om deze te corrigeren. De wond wordt na de ingreep gehecht.

## **Na de operatie**

Na de operatie kan het gebied rondom het oog dik, blauw en gezwollen zijn. Het oog kan ook branderig aanvoelen. Zeker de eerste uren na de operatie kunt u last hebben van troebel zicht, maar vrijwel nooit zo dat men niet meer kan zien. Er wordt geen verband aangebracht en wassen en douchen blijft mogelijk (wel aangeraden wordt om de huid zeer voorzichtig droog te deppen). Het is van belang dat vooral de eerste dagen na de operatie zo min mogelijk druk op uw hoofd komt te staan. U mag niet teveel bukken, persen of zwaar tillen. Na ongeveer zeven dagen worden de

hechtingen en eventuele pleisters verwijderd.

Op de polikliniek Oogheelkunde maakt de verpleegkundige hiervoor een afspraak.

### **Wat u verder nog moet weten**

Uw oog kan er in de eerste dagen gezwollen en blauw uitzien. De ergste zwelling en verkleuring verdwijnen na ongeveer 10 dagen. Pas na drie maanden kunt u het definitieve resultaat van de ingreep zien. Uw ooglid kan wel tijdelijk strak aanvoelen. Dit herstelt zich in de loop van een aantal weken meestal vanzelf. In de zon en onder de zonnebank moet u uw geopereerde ooglid de eerste maanden goed beschermen.

### **Complicaties**

Complicaties zoals een nabloeding of infectie komen maar zelden voor. Neemt u direct contact op met de polikliniek Oogheelkunde of de Spoedeisende Hulp, als u na een operatie aan uw ooglid ernstige pijn krijgt in of rondom uw oog. Ook is het verstandig contact op te nemen als u ineens slechter gaat zien in de eerste uren na de operatie. Soms kan een ectropion of een entropion terugkomen, ondanks de operatie.

### **Vragen**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend oogarts of contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde via (0181) 65 85 90



