



Gastroscoopie

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over de gastroscoopie. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

Uw afspraak

Uw onderzoek:

Datum:

.....

Tijd:

.....

Meldt u zich bij de afdeling Endoscopie
(route 109)

Wat is een gastroduodenoscopie?

Bij een gastroduodenoscopie wordt het slijmvlies (de binnenbekleding) van de slokdarm, de maag en het eerste deel van de twaalfvingerige darm bekeken met een endoscoop. Een endoscoop is een dunne flexibele slang met aan het uiteinde een kleine videocamera. Onderzoek duurt ongeveer 15 min.

Doel van het onderzoek:

Met dit onderzoek kan uw behandelend arts afwijkingen aan uw slokdarm, maag of twaalfvingerige darm opsporen. Ook kunnen via de gastroscoop kleine ingrepen worden gedaan zoals het verwijderen van kleine poliepen. Verder kan op deze manier weefsel worden weggenomen voor nader onderzoek (= biopsie).

Vorbereiding:

Als u 's ochtends wordt geholpen:

U mag de avond vóór het onderzoek vanaf 24.00 uur niets meer eten, drinken en/of roken. Ook het kauwen van kauwgom is niet toegestaan. Wel mag u uw medicijnen innemen met een klein slokje water, indien nodig.

Als het onderzoek na 13:00 uur plaatsvindt mag u tot 08.00 uur 's ochtends een licht ontbijt: kopje thee of koffie en twee beschuitjes zonder boter of beleg. Daarna mag u niets meer eten. Ook het kauwen van kauwgom is niet toegestaan.

U mag 4 uur vóór het onderzoek niet meer drinken en/of roken.

Het onderzoek kan alleen goed worden uitgevoerd als uw slokdarm en maag leeg zijn.

Een gastroscoopie wordt poliklinisch uitgevoerd. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten, afhankelijk van eventuele extra ingrepen.

Bijzondere omstandigheden:

Vertel uw arts in ieder geval vóór het onderzoek

- of u zwanger bent
- of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen



- welke medicijnen u gebruikt, bijvoorbeeld bloedverdunners of insuline
- of u een longziekte, epilepsie, diabetes of andere aandoening heeft
- of u een hartafwijking en/of hartgebrek heeft

Meestal is het nodig te wachten met het innemen van uw medicijnen tot na het onderzoek. Uw arts bespreekt dit met u. Neemt u uw medicijnen in ieder geval mee naar het ziekenhuis zodat u deze na het onderzoek kunt innemen.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie (route 109). Wij verzoeken u uw patiëntenkaart mee te nemen op de dag van het onderzoek en een lijstje met alle medicijnen die u gebruikt. Wij adviseren u niet knellende en makkelijk zittende kleding te dragen en geen sieraden (ook geen tong piercings) te dragen en/of waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen.

Het onderzoek:

Als voorbereiding op het onderzoek wordt uw keel verdoofd met een spray om de neiging tot kokhalzen zoveel mogelijk tegen te gaan. U wordt verzocht op uw linkerzij op de onderzoektafel te gaan liggen. Daarna krijgt u een plastic bijtring tussen de tanden of kaken geplaatst. Het licht in de behandelkamer wordt tijdens het onderzoek gedimd. De arts brengt via uw mond de dunne flexibele slang in uw maag. Hiervoor vraagt hij u te slikken. Tijdens deze handeling blijft u rustig door uw neus en mond ademen.

Doordat via de slang lucht in de maag wordt geblazen, kan het zijn dat u tijdens het onderzoek moet opboeren. Dit is een normaal verschijnsel en u hoeft zich hier niet voor te schamen.

Het onderzoek verloopt het beste als u probeert zo ontspannen mogelijk te zijn. Het inbrengen van de slang is een vervelend gevoel maar doet geen pijn, omdat uw keel is verdoofd. U hoeft niet bang te zijn dat u geen lucht meer krijgt, want er blijft naast de slang nog genoeg ruimte in de keelholte over om te ademen.

Na het onderzoek:

Na het onderzoek mag u meteen naar huis. Het kan zijn dat uw keel een beetje rauw en gevoelig aanvoelt, vooral als u veel heeft moeten opboeren. Dit gaat snel weer over.

Wanneer u keelverdooving heeft gehad, mag u tenminste een half uur na het onderzoek niet eten en drinken. Uw keel is verdoofd en u zou zich gemakkelijk kunnen verslikken. Begint u daarna voorzichtig kleine beetjes te drinken en te eten.

Mogelijke complicaties:

Een gastroscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Zoals bij elk onderzoek kunnen echter complicaties optreden, zoals:

- een luchtweginfectie of longontsteking als gevolg van het zich verslikken in de maaginhoud. Dit gebeurt vaker bij mensen die een roesje hebben gehad.
- een scheurtje in de slokdarm of maag. Dit komt echter zelden voor.



Soms is het noodzakelijk bij complicaties of verdere behandelingen dat u wordt doorverwezen naar het Maasstad Ziekenhuis.

Neemt u contact op:

Als na het onderzoek klachten optreden, bijvoorbeeld koorts of benauwdheid, neemt u dan direct contact op met de afdeling Endoscopie.

De uitslag:

De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend arts bij de eerst volgende afspraak besproken. De afspraak kan zijn met uw huisarts of de behandelende arts in het ziekenhuis. Wanneer er weefsel is afgenomen, duurt het 5 werkdagen voordat de uitslag bekend is.

Tot slot:

Inzien medische gegevens

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl

Bereikbaarheid afdeling Endoscopie

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met afdeling Endoscopie via 0181-65 83 53.

Raadpleeg onze website voor de actuele tijden.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.