



FLAPOORCORRECTIE

Binnenkort ondergaat uw kind een flapoorcorrectie. Deze folder geeft informatie over de operatie zelf, de voorbereiding en de periode na de operatie.

Wat is een flapoorcorrectie?

Het corrigeren van de oorschelpen heet een zogenaamde flapoorcorrectie of otoplastiek. Tijdens deze ingreep worden de oorschelpen in een nieuwe positie gebracht en zonodig van vorm veranderd, zodat ze dichterbij het hoofd komen te staan.

De operatie kan vanaf de leeftijd van vier jaar plaatsvinden, omdat de oorschelp op deze leeftijd de volwassen grootte bijna bereikt heeft. Zo kan voorkomen worden dat uw kind geplaagd wordt met de stand van zijn of haar oorschelp. De zorgverzekeraar moet vooraf toestemming geven voor deze operatie. De aanvraag hiervoor wordt door ons gedaan.

Vorbereiding

Wat neemt u mee?

- Verzekeringsbewijs
- ID-bewijs
- In verband met hygiëne is het belangrijk dat uzelf en uw kind geen sieraden draagt tijdens het ziekenhuisverblijf.

Nuchter zijn

Voor de operatie is het van belang dat uw kind nuchter is. Meer informatie leest u in de folder 'Voorlichting rondom de operatie voor kinderen'. Het is van belang dat u deze richtlijnen opvolgt.

Preoperatief spreekuur (POS-poli)

Ter voorbereiding op de operatie gaat u samen met uw kind voorafgaand aan de operatie naar het preoperatief spreekuur. U ontvangt daar informatie over de anesthesie en de voorbereiding op de operatie. Ook kan u samen met uw kind naar een voorlichtingsbijeenkomst gaan, waarbij onze pedagogisch medewerker u en uw kind voorlicht over de gang van zaken op de dag van de operatie.

Afspraak

U wordt door het secretariaat van de KNO gebeld om een afspraak voor de ingreep te maken. Ongeveer een week voor deze datum krijgt u schriftelijk bericht over het tijdstip waarop u deze dag wordt verwacht.

Medicijngebruik

Wilt u altijd een actuele medicijnlijst meenemen? Heeft u deze niet neem dan uw medicatie in de originele verpakking mee.

Het is belangrijk dat uw arts op de hoogte is welke soort medicijnen u gebruikt. De anesthesist bespreekt dit uitgebreid met u tijdens uw bezoek aan de POS poli.

Pijnstilling

Wij raden u aan om voor de operatie Paracetamol tabletten of zetpillen in huis te halen. Als uw kind weer thuis is kunt u deze volgens gebruiksaanwijzing toedienen.

De dag van de operatie

Waar meldt u zich?

U en uw kind melden zich bij de receptie van de hoofdingang voor de dagopname. U heeft een bevestiging van de afspraak ontvangen waarop datum en tijdstip van opname staan vermeld.

De operatie

De operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling: u komt 's morgens naar het ziekenhuis en gaat aan het eind van de dag weer naar huis. De operatie duurt ongeveer een uur. De operatie wordt onder algehele verdoving (narcose) uitgevoerd.

Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt op een speciale manier omgevouwen en eventueel behandeld met ondiepe insnijdingen. Daarna wordt het met speciale hechtingen vastgezet. Vervolgens wordt een stukje van de huid aan de achterzijde van het oor verwijderd en wordt de wond gesloten.

Na de operatie

Na de operatie wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. Als alle controles goed zijn wordt uw kind terug gebracht naar de kinderafdeling. De eerste dagen na de operatie kan uw kind pijn hebben. U mag uw kind in de week na de operatie geen Aspirine, Ascal, Aasprobruis of kinderaspirine geven. Paracetamol kunt u wel gewoon gebruiken.

Na een oorcorrectie krijgt uw kind een strak verband (een zogenaamde tulband) om uw het hoofd heen. Dit verband moet een week blijven zitten. U kunt dan niet het haar wassen. Na een week komt u terug naar de polikliniek voor de eerste controle. Dan verwijdert de KNO-arts de hechtingen en het verband. Als het verband verwijderd is, moet uw kind nog 2 weken 's nachts een hoofdband dragen ter bescherming van de oren. Ook overdag moet hij/zij voorzichtig zijn met de oren. Het is verstandig om contactsporten 4 tot 6 weken te vermijden. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog 6 tot 8 weken wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen.

Complicaties

Uw arts zal vooraf met u de eventuele risico's van de behandeling bespreken. Het rechtzetten van flaporen heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

In de volgende gevallen neemt u contact op met de KNO-arts:

- Als het verband loslaat
- Bij een nabloeding
- Bij pijn langer dan 2 dagen
- Bij koorts

Het resultaat

De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren naar zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om een tweede correctie uit te voeren. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de plek niet opvallend.

Als u overweegt uw oren of de oren van uw kind recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten. Maar een absolute symmetrie van de stand van de oren is vrijwel onmogelijk en onnatuurlijk.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek KNO op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, telefoonnummer (0181) 65 85 89.

Machtiging zorgverzekeraar

Een flapoorcorrectie valt niet onder de basisvergoeding van uw zorgverzekeraar. Voor deze operatie moet uw zorgverzekeraar een machtiging verstrekken. Deze machtiging wordt door ons aangevraagd waarna de zorgverzekeraar 8 weken tijd heeft om de

beslissing te nemen. Van deze beslissing krijgt zowel u als het ziekenhuis bericht. Als uw zorgverzekeraar de machtiging afwijst kan de operatie ook voor eigen rekening uitgevoerd worden.

Pas als de beslissing van de zorgverzekeraar bekend is, zullen wij de afspraken voor de POS-poli en de operatie gaan maken.