



EVLT BEHANDELING

Naar aanleiding van de resultaten van het duplex onderzoek en het intake gesprek is in overleg met u besloten een EVLT behandeling uit te voeren. De specialist voert de behandeling uit. Wij adviseren u om een uur voor de behandeling 2 stuks paracetamol van 500 mg in te nemen.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De behandeling is poliklinisch en u hoeft niet nuchter te zijn. Na de behandeling mag u direct naar huis. In het te behandelen gedeelte wordt een katheter geplaatst. Met een echo-apparaat wordt vervolgens de juiste positie van de katheter bepaald. Daarna wordt het te behandelen gedeelte van de spatader lokaal verdoofd met kleine prikken. Bij de EVLT behandeling geeft de tip van de katheter laserenergie af. De katheter in de ader wordt nu voorzichtig teruggetrokken. Tijdens het terugtrekken van de katheter* wordt de wand van het bloedvat verhit en sluit deze zodat het bloedvat als het ware wordt afgebroken door het lichaam.



* Terugtrekken van de katheter in de ader

Na de ingreep

Patiënten die de behandeling ondergaan, konden meestal hun dagelijkse activiteiten na 1 dag hervatten, tenzij zij een beroep hebben waarbij zij veel moeten staan of zitten en zwaar moeten tillen. Dan is het raadzaam om de 1^e week rustig aan te doen. Na de ingreep moet u gedurende 2 dagen (dag en nacht) een aangemeten steun-/verbandkous dragen. U mag de 1^e 48 uur niet douchen. Ga regelmatig lopen en/of fietsen, maar vermijd langdurig staan en zware lichamelijke inspanning zo veel mogelijk.

Zijn er bijwerkingen?

Direct na de behandeling gaat de ader krimpen, wat voelbaar kan zijn. Op de behandelde plek kan een bloeding ontstaan. Verder kan het de behandelde plek er rood uitzien en warm aanvoelen. Bij hevige klachten en bij koorts neemt u contact op met de polikliniek chirurgie. De dichtgemaakte ader kan donker gekleurd zijn en soms voelbaar zijn als een harde streng of harde stukjes. Dit verdwijnt na ongeveer 3 maanden. Neem indien nodig paracetamol of diclofenac.

Na 2 à 3 maanden na de ingreep komt u terug voor controle. Over het algemeen nemen de zichtbare spataderen binnen

3 maanden af. Resterende spataderen kunnen later behandeld worden.

Aanvullende behandelingen

Voor het beste cosmetische resultaat kunt u besluiten om na de procedure in overleg met de arts een aanvullende behandeling uit te laten voeren. Zoals bijvoorbeeld met scleroseren of lasertherapie. Het resultaat is mooiere benen en minder klachten. Dit is meestal niet vergoede zorg.

Vragen over de behandeling?

Bij vragen of problemen over uw behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur via telefoon 0181 – 65 84 21. Bij spoed belt u via 0181 – 65 88 88.

Overige vragen?

Ook voor overige vragen kunt u ons bereiken via telefoon 0181 – 65 84 21 van maandag t/m vrijdag.

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken via 0181 – 65 84 21. Bent u verhinderd, meld ons tijdig uw verhindering en wij maken een nieuwe afspraak met u.

Tot slot

Indien u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met uw behandelend arts. Zij zijn bereikbaar via het secretariaat Chirurgie.

Wij maken u er op attent, dat vergoeding van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te

gaan in hoeverre de kosten voor u worden vergoed.

Meer informatie leest u in de folder 'Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?' op www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht > item Algemeen en die tevens verkrijgbaar is bij de medewerkers van het ziekenhuis. Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. Deze website biedt informatie over de zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde vragen en geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt.