



Markering borstafwijking met jodiumzaadje

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over een markering van de borstafwijking met een jodiumzaadje. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

Als de afwijking in de borst niet helemaal duidelijk voelbaar is en de afwijking uit de borst verwijderd moet worden (borstsparende operatie), volgt een lokalisatieprocedure op de röntgenafdeling. Dit onderzoek vindt poliklinisch voorafgaand aan de operatie plaats (hoeft niet op de dag van de operatie te zijn) of voordat u start met medicijnen. Bij dit onderzoek wordt, met behulp van röntgen- of echoapparatuur, door de radioloog een radioactief jodiumzaadje in de borst ingebracht.

De chirurg kan tijdens de operatie het jodiumzaadje opzoeken met behulp van een detector, zodat op de juiste plek weefsel uit de borst kan worden verwijderd. Het jodiumzaadje is van metaal en 4 mm groot. Het geeft een lage dosis straling af, die niet schadelijk is voor de gezondheid van u en uw omgeving. Het zaadje blijft in uw borst zitten tot de operatie, daar wordt het samen met de afwijking uit uw borst verwijderd.

Lymfeklier markeren

Als u een uitzaaiing in de lymfeklier van de oksel heeft en u krijgt eerst een behandeling met medicijnen (zoals chemotherapie), wordt de lymfeklier soms ook gemarkeerd door het inbrengen van een jodiumzaadje. De betreffende klier kan dan tijdens de operatie die later volgt ook worden verwijderd.

Vorbereiding

Wij adviseren u om op de dag van het onderzoek een stevige bh of sport bh te dragen. Wij vragen u om op de dag van het onderzoek uw borsten niet in te smeren (bodylotion, crème, zalf of poeder). Dit kan verstoring geven van het röntgenbeeld.

Het inbrengen van het jodiumzaadje

Het jodiumzaadje kan op twee manieren worden ingebracht. De radioloog bepaalt welke procedure voor u optimaal is. Als het jodiumzaadje dient om een lymfeklier te markeren, wordt het altijd ingebracht met behulp van echografie.



Met behulp van echografie

Met de echo zoekt de radioloog de plek waar de punctie moet plaatsvinden op. Het radioactieve jodiumzaadje bevindt zich in een naald. Nadat de huid is gedesinfecteerd en uw borst is verdoofd, wordt de naald in de borst of in de betreffende lymfeklier ingebracht. De naald wordt voorzichtig teruggetrokken en het jodiumzaadje blijft achter. Daarna wordt op de mammografiekamer een controle-opname gemaakt om te kijken of het jodiumzaadje op de juist plaats zit.

Met behulp van röntgenstralen

Indien dit onderzoek met behulp van röntgenstralen noodzakelijk is, komt u te zitten voor het mammografie apparaat en blijft uw borst gedurende het onderzoek tussen de platen van het apparaat. Als het jodiumzaadje geplaatst is, worden nog controlefoto's gemaakt om te kijken of het zaadje op de juiste plaats zit.

Tot slot

Inzien medische gegevens

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.

Bereikbaarheid poliklinieken

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met polikliniek oncologie via 0181 – 65 81 60 of polikliniek mammacare 0181 – 65 82 97.

Raadpleeg onze website voor de actuele tijden.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.