



Urodynamisch onderzoek

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over het urodynamisch onderzoek. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek wordt vaak aangevraagd om de oorzaak van plasklachten na te gaan. Het betreft een poliklinisch inwendig onderzoek naar de functie van de lagere urinewegen (blaas- en afsluitingsmechanisme).

Vorbereiding

Als u een blaasontsteking hebt of ongesteld bent, kan het onderzoek beter uitgesteld worden. Neemt u daarvoor contact op met de polikliniek Urologie.

Het onderzoek

Voor het ondergaan van het onderzoek krijgt u schriftelijk of telefonisch bericht thuis.

De behandeling

In de kleedkamer ontbloot u het onderlichaam en plast u uit op het toilet. Daarna neemt u plaats op de onderzoeksstoel. Er wordt een katheter (dun slangetje) via de plasbuis in de blaas gebracht en eventueel achtergebleven urine wordt gemeten. Hierna worden de meetkatheters geplaatst. Bij de vrouw is dat een slangetje in de blaas en een in de vagina. Bij de man is dat een slangetje in de blaas en een via de anus in de endeldarm.

Het inbrengen is niet pijnlijk, maar kan wel soms een onaangenaam gevoel geven. De slangetjes worden met pleisters op de huid geplakt, zodat ze goed op hun plaats blijven. Er wordt ook een aantal plakelektrodes naast de anus bevestigd, hiermee wordt de werking van de bekkenbodemspieren gemeten.

Tijdens het onderzoek wordt de blaas gevuld met steriel water en worden de drukveranderingen en reacties van de blaas automatisch geregistreerd. Tijdens de meting wordt u gevraagd precies aan te geven wat u voelt. Dit gevoel kan variëren van lichte aandrang tot sterke aandrang. Als de vulling van de blaas pijnlijk wordt, wordt het onderzoek meteen afgesloten.

Ook wordt er tijdens het onderzoek gevraagd om te hoesten, hiermee wordt gekeken wat er gebeurt bij drukverhogende momenten.

Na het afsluiten van het onderzoek plast u leeg in een speciale trechter waarmee de kracht van de plasstraal en het volume gemeten worden.

De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 30-45 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u door het inbrengen van de slangetjes lichte irritatie in blaas of plasbuis krijgen. Om dit te voorkomen of te verhelpen is het verstandig om na het onderzoek ruim te drinken. Het slikken van antibiotica is niet nodig.

U hoort de uitslag van uw verwijzend specialist of de uroloog bij uw vervolg bezoek.

Tot slot

Inzien medische gegevens

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met polikliniek Urologie. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur via 0181-65 83 89.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.