



Prostaatbiopsie

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over de prostaatbiopsie. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

De prostaat is een klier, ongeveer zo groot als een walnoot, die vlak onder de blaasuitgang om de urinebuis heen ligt. De functie van de prostaat is het produceren van vocht, dat de zaadcellen vervoert. De urinebuis verzorgt de urine-afvoer vanuit de blaas naar buiten.

Wanneer de prostaat vergroot is, kan de urineafvoer worden belemmerd. Meestal gaat het om een goedaardige vergroting, maar soms kan er ook kwaadaardig weefsel ontstaan. Bij de verdenking op een kwaadaardig gezwel kunnen bipten worden genomen.

Doel van het onderzoek

Het verkrijgen van weefsel voor onderzoek om hiermee meer inzicht te krijgen over de toestand van de prostaat.

Vorbereiding

Voor het onderzoek is het van belang dat de blaas goed gevuld is. Daarom vragen wij u om 2 à 3 uur vóór het onderzoek niet meer te plassen. Verder zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats.

Als er bipten worden genomen, moet u vóór het onderzoek starten met antibiotica. Het recept heeft u via uw behandelend arts ontvangen. Het is soms nodig om het gebruik van bepaalde medicijnen tijdelijk te stoppen, bijvoorbeeld bloedverdunners. Uw behandelend arts bespreekt dit met u.

Het onderzoek

Het onderzoek gaat altijd samen met een echo van de prostaat. De echo probe wordt via de anus ingebracht. Met een biptienaald worden enkele stukjes weefsel uit de prostaat weggehaald. Deze worden in het laboratorium onderzocht. Deze prikken zijn niet pijnlijk, hooguit gevoelig.

De uitslag

De uitslag van het weefselonderzoek ontvangt u na één tot twee weken. Hiervoor wordt een aparte afspraak met u gemaakt.

Na het onderzoek

Na afloop kunt u meestal meteen naar huis. Zorg ervoor dat u begeleid wordt naar huis. U mag niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Bijwerkingen

Na de biopsie kan er wat bloed meekomen bij de urine, ontlasting en het sperma. Dit kan enkele dagen tot een week duren. Bij het sperma soms wel langer.

Wanneer neemt u contact op?

Neem contact op met de polikliniek Urologie als het bloedverlies zeer heftig is of als uw temperatuur hoger is dan 38,5°C. Uw behandelend arts schrijft dan antibiotica voor om infectie te voorkomen.

Tot slot

Inzien medische gegevens

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met polikliniek Urologie. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur via 0181-65 83 89.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.