




Plaatsen van een suprapubische katheter (SPC)

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over het plaatsen van een suprapubische katheter. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

Inleiding

Een suprapubische katheter is een dun slangetje dat via de buikwand in de blaas wordt ingebracht. Om te voorkomen dat de katheter uit de blaas glijdt, bevindt zich aan het uiteinde een ballonnetje dat gevuld wordt met water. Door de katheter kan de urine aflopen.



Vorbereiding

De ingreep vindt plaats op de polikliniek Urologie en is onder plaatselijke verdoving. U mag voor de ingreep gewoon eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn. Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, dan zal deze medicatie in overleg met uw arts voor de ingreep tijdelijk worden gestopt.

U mag niet met eigen vervoer komen. Laat u halen en brengen of ga met het openbaar vervoer.

De ingreep

De ingreep vindt plaats op de polikliniek Urologie. Voor de ingreep dient de blaas gevuld te worden, indien nodig wordt er een katheter via de plasbuis ingebracht om de blaas te vullen. Op de plaats waar de suprapubische katheter komt wordt de huid zo diep mogelijk verdoofd. De arts maakt in de huid een sneetje, dan wordt met een dikkere naald de blaas aangeprikt. Dit kan pijnlijk zijn. Door deze dikkere naald wordt de katheter ingebracht en wordt de ballon opgeblazen zodat deze op zijn plaats blijft. De katheter wordt soms ook met een hechting vastgezet. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten.

Complicaties

Hoewel de plaatsing van de suprapubische katheter meestal zonder complicaties verloopt, kan de ingreep of het herstel anders verlopen dan verwacht.

De volgende complicaties kunnen zich voordoen:

- Bloedverlies bij de urine ten gevolge van de punctie. Dan is het noodzakelijk goed te spoelen door extra veel te drinken;
- Beschadiging van omliggende weefsels zoals een bloedvat of de darm. Het risico hierop wordt kleiner indien de blaas goed gevuld kan worden voor de punctie.
- Indien u langere tijd een katheter heeft kan het gebeuren dat er urine langs de katheter lekt (dit kan ook via de plasbuis), de katheter verstopt raakt, de katheter uitvalt en dat u blaaskrampen krijgt.

Let op:

- Indien de katheter is uitgevallen moet er zo spoedig mogelijk een nieuwe ingebracht worden voordat het gaatje zich gesloten heeft. Neem contact op met de poli Urologie;
- Een verstopte katheter die met spoelen niet open gaat moet gewisseld worden;
- Blaaskrampen zijn vaak een gevolg van irritatie door de katheter, soms kunnen medicijnen hiervoor helpen.

Verwisselen van de katheter

De eerste wissel vindt in principe altijd plaats op de polikliniek Urologie. De volgende wissels vinden plaats na 6 tot 12 weken. Dit wordt gedaan op de poli Urologie, door de thuiszorg of bij de huisarts.

Na de ingreep

Na de ingreep kunt u meteen weer naar huis. U krijgt direct materiaal mee en een informatiefolder over verzorging van de katheter.

Als u thuis bent kunt u wat bloed in de urine hebben. Dit is niet ernstig en verdwijnt meestal vanzelf. De insteekopening van de katheter moet de eerste dagen afgedekt worden met een gaasje totdat het wondje van de insteekopening droog is geworden. Vaak zit er wat slijm rond de katheteropening, dit is normaal.

Het is van belang om de katheter regelmatig te verzorgen. Hoe u dit moet doen staat beschreven in de folder Verblijfskatheter.



Wanneer neemt u contact op?

Neem contact op met de polikliniek Urologie als er pus uit de wond komt, als u meer dan 38.5 graden koorts krijgt of als u pijnklachten heeft die niet verdwijnen na het innemen van pijnstilling.

Tot slot

Inzien medische gegevens

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met polikliniek Urologie. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur via 0181 - 65 83 89.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181 - 65 88 88.