

Gabapentine

Doel van de behandeling

Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn gabapentine, ook wel bekend als Neurontin®. Dit medicijn is effectief bij de behandeling van zenuwpijn. Van oorsprong wordt dit middel gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Bij deze toepassing bleek dat dit medicijn ook effectief is voor de behandeling van zenuwpijn. Met deze reden is dit medicijn aan u voorgeschreven.

Opbouwschema

Gabapentine moet worden opgebouwd volgens één van onderstaande schema's. Indien er ongewenste bijwerkingen optreden, kan de dosering worden teruggebracht naar een lagere dosering en eventueel later weer opgebouwd worden. Indien u moet stoppen met het gebruik van gabapentine, bespreek dan met uw behandelaar of de pijnverpleegkundige hoe u de dosering van het medicijn het beste kunt afbouwen.

Dag	Ochtend	Middag	Avond	Dosering per dag
1			1 x 100 mg	100 mg
2	1 x 100 mg		1 x 100 mg	200 mg
3	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	300 mg
4	1 x 100 mg	1 x 100 mg	2 x 100 mg	400 mg
5	2 x 100 mg	1 x 100 mg	2 x 100 mg	500 mg
6	2 x 100 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	600 mg
7	2 x 100 mg	2 x 100 mg	1 x 300 mg	700 mg
8	1 x 300 mg	2 x 100 mg	1 x 300 mg	800 mg
9	1 x 300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg	900 mg
10	1 x 300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1000 mg
11	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1100 mg
12	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1200 mg
13	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1300 mg
14	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1400 mg
15	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1500 mg
16	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	2 x 300 mg	1600 mg
17	2 x 300 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	2 x 300 mg	1700 mg
18 en verder	2 x 300 mg	2 x 300 mg	2 x 300 mg	1800 mg

Postbus 777
3200 GA Spijkenisse

Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 - 65 88 88
F 0181 - 65 92 80
I www.spijkenissemc.nl

Alternatief opbouwschema

Er is een alternatief opbouwschema waarbij alleen capsules van 300 milligram gebruikt hoeven te worden:

Dag	Ochtend	Middag	Avond	Dosering per dag
1 t/m 3			1 x 300 mg	300 mg
4 t/m 6	1 x 300 mg		1 x 300 mg	600 mg
7 t/m 9	1 x 300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg	900 mg
10 t/m 12	1 x 300 mg	1 x 300 mg	2 x 300 mg	1200 mg
13 t/m 15	2 x 300 mg	1 x 300 mg	2 x 300 mg	1500 mg
16 en verder	2 x 300 mg	2 x 300 mg	2 x 300 mg	1800 mg

Dosering

De maximale dosering bij mensen met normaal werkende nieren en een normaal werkende lever is 3600 milligram (3 maal per dag 1200 milligram). U wordt geadviseerd om het gebruik van gabapentine op te bouwen tot een dosering van 1800 milligram (3 maal per dag 600 mg), dag 18) en daarbij het effect te beoordelen. Wanneer u bij het gebruik van een lagere dosering al een goed effect bemerkt, hoeft u de dosering niet verder op te bouwen en kunt u deze dosering blijven gebruiken.

Afspraak

Bij het voorschrijven van gabapentine heeft u een telefonische afspraak gekregen, meestal twee weken nadat u bent gestart met het medicijn. Tijdens deze telefonische afspraak worden met u de werking en de eventuele bijwerkingen van het medicijn besproken. In het gesprek wordt besproken of de dosering van gabapentine verder opgehoogd wordt.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan een van de medewerkers van de pijnpoli . Zij zijn te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur op telefoonnummer (0181) 658460.

Postbus 777
3200 GA Spijkenisse

Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 - 65 88 88

F 0181 - 65 92 80

I www.spijkenissemc.nl