

Perifere Zenuwblokkade

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is uw pijn te verminderen. Dit wordt gedaan door één of meer zenuwen te behandelen met medicatie of stroom waardoor de geleiding van de pijnsignalen verminderd wordt.

Algemene informatie

Om het lichaam bevinden zich zenuwen die (pijn)signalen van en naar de hersenen geleiden. Wanneer deze zenuwen geïrriteerd, bekneld of beschadigd worden, kunt u pijn ervaren.

Vorbereiding

De anesthesioloog-pijnspecialist of verpleegkundig specialist heeft het volgende met u afgesproken:

U stopt ____ dag(en) voor de behandeling met het gebruik van de aangekruiste medicijnen:

- NSAID, zoals:
- Acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium (Ascal)
- Clopidogrel (Plavix/Grepid)/ pasugrel (Efient)/ ticrigrelor (Brilique)
- Dipyridamol (Persantin)
- Acenocoumarol (Sintrom)
- Fenprocoumon (Marcoumar)
- DOAC (dabigatran, rivaroxaban en apixaban)
- overig, zoals:.....

U laat wel/niet een uur voor aanvang van de behandeling bloed afnemen.

Na de behandeling krijgt u instructies van de arts over het hervatten van uw bloedverdünnende medicatie. Indien u bloedverdünnende medicatie krijgt voorgeschreven via de trombosedienst of het Star-MDC dient u deze organisatie zelf te informeren over het stoppen en hervatten van de medicatie. U krijgt hiervoor een brief mee.

U kunt de dag van de behandeling eten en drinken en uw gebruikelijke (pijn)medicatie innemen.

Postbus 777
3200 GA Spijkenisse

Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 - 65 88 88
F 0181 - 65 92 80

I www.spijkenissemc.nl

In het ziekenhuis

U meldt zich een half uur voor de behandeling op de afdeling Dagverpleging op de eerste etage. U meldt zich bij de balie waar uw gegevens worden gecontroleerd, u krijgt een polsbandje. Een verpleegkundige brengt u naar een kamer. Hier kleedt u zich om in een operatiejasje en neemt u plaats in bed. U wordt naar de behandelruimte gebracht. In de behandelruimte zijn naast de anesthesioloog-pijnspecialist ook een verpleegkundige en een röntgenlaborant aanwezig. Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent.

Behandeling

U wordt verzocht om plaats te nemen op de behandeltafel. De anesthesioloog plaatst met behulp van echografiebeelden of röntgenfoto's één of meerdere naalden. Met behulp van een elektrische zwakstroom wordt soms gecontroleerd of de naald/naalden op de juiste plaats staat/staan. Hierbij kunt u gevoelsverandering ervaren. Er wordt gevraagd waar u dit ervaart. Wanneer de naald/naalden op de juiste plaats staat/staan, wordt de medicatie ingespoten (proefblokkade, therapeutische blokkade) of krijgt u een verdoving ingespoten waarna de behandeling met stroom wordt gestart. De medicatie verdooft de zenuw en kan de zwelling rondom een geïrriteerde of beknelde zenuw verminderen. De stroom beïnvloedt de pijngeleiding van de zenuw, waardoor in veel gevallen 6 tot 24 maanden pijnvermindering optreedt. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Na de behandeling neemt u weer plaats op uw bed, waarna u naar de afdeling Dagverpleging wordt teruggebracht.

Opvang

U wordt opgevangen door een verpleegkundige en u krijgt iets te drinken. Tevens worden er bij u controles gedaan. U blijft na de behandeling gemiddeld 30 minuten op de afdeling Dagverpleging. Maximaal één persoon mag u hierbij gezelschap houden.

Let op

Na de blokkade kan door de verdoving tijdelijk krachtverlies en/of uitval van gevoel optreden in één of beide benen of armen. U mag niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt.

Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, latex, contrastmiddel, of ontsmettingsmiddel, meld dit dan voor de behandeling.

De behandeling kan niet uitgevoerd worden wanneer u (mogelijk) zwanger bent. De reden hiervoor is dat er tijdens de behandeling röntgenstraling gebruikt wordt.

De behandeling kan in sommige gevallen niet uitgevoerd worden wanneer u (mogelijk) zwanger bent. De reden hiervoor is dat er tijdens de behandeling in sommige gevallen röntgenstraling gebruikt wordt.

Postbus 777
3200 GA Spijkenisse

Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 - 65 88 88
F 0181 - 65 92 80
I www.spijkenissemc.nl

Resultaat

Bij een proefblokkade kunt u het effect beoordelen in de eerste uren na de behandeling, bij een therapeutische blokkade kan dit na enkele dagen. Bij een behandeling met stroom duurt het gemiddeld twee weken voordat u resultaat kunt bemerken. Vaak is het pas na zeven weken zinvol het resultaat van een therapeutische blokkade of een behandeling met stroom te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een vermindering van de pijn ervaart.

Mogelijke complicaties

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De behandeling met een perifere zenuwblokkade zelden tot blijvende schade. Uw arts overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico's met zich meebrengt.

Afspraak

Bent u verhinderd voor een afspraak? Neem dan telefonisch contact op met een van de balie medewerkers van de pijnkliniek. Zij zijn te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur op telefoonnummer (0181) 658460.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan een van de medewerkers van de pijnpoli. Zij zijn te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur op telefoonnummer (0181) 658460.

Postbus 777
3200 GA Spijkenisse

Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 - 65 88 88

F 0181 - 65 92 80

I www.spijkenissemc.nl