

Tapentadol

Doel van de behandeling

Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn tapentadol, ook wel bekend als Palexia®. Tapentadol is een sterke pijnstiller (opioid) voor matige tot hevige chronische pijn. Tapentadol heeft invloed op de pijn bij bewegen (mechanische pijn) en op zenuwpijn (neuropathische pijn).

Gebruik

Tapentadol is niet geschikt bij een plotselinge pijnaanval. Het gaat om tabletten met een gereguleerde afgifte (retard) en deze werken binnen een paar uur. De werking houdt ongeveer 12 uur aan. Gebruik tapentadol volgens een vast schema zoals afgesproken met uw arts of verpleegkundig specialist.

De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken

U kunt het medicijn gebruiken zolang u hevige pijn heeft. Indien uw situatie het toelaat, zal uw arts of verpleegkundig specialist met u overleggen of afbouwen mogelijk is en of u kunt overgaan naar een minder sterke pijnstiller.

Mogelijke complicaties / bijwerkingen

Het is goed te weten dat ieder geneesmiddel bijwerkingen heeft, maar dat niet iedereen deze zal krijgen. De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van tapentadol zijn misselijkheid, duizeligheid, sufheid, slaperigheid en hoofdpijn voor meerdere dagen. Verstopping (obstipatie) komt vaak voor en kan ernstig zijn. Voorkom dit door in overleg met uw arts of verpleegkundig specialist een laxeermiddel te gebruiken.

Pas op met alcohol. Dit kan u extra suf maken.

Vanwege de mogelijke sufheid, slaperigheid en duizeligheid mag u de eerste 2 weken niet autorijden. Na 2 weken zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden, maar doe dit alleen als u geen last meer heeft van deze bijwerkingen.

Als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met tapentadol. Als u dit medicijn al enkele weken gebruikt kunt u beter geleidelijk met tapentadol stoppen. Dan heeft u minder last van ontwenningverschijnselen. Uw arts of verpleegkundig specialist kan u hierbij adviseren.

Afspraak

Bij het voorschrijven van tapentadol heeft u een telefonische afspraak gekregen, meestal 2 tot 3 weken nadat u bent gestart met het gebruik van het medicijn. Tijdens deze telefonische afspraak wordt met u de werking en de eventuele bijwerkingen van het medicijn besproken. In het gesprek wordt ook besproken of de dosering van de tapentadol verder opgehoogd wordt. U mag het medicijn NIET zelf ophogen.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan een van de medewerkers van de pijnpoli. Zij zijn te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur op telefoonnummer (0181) 658460.

Postbus 777
3200 GA Spijkenisse

Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 - 65 88 88

F 0181 - 65 92 80

I www.spijkenissemc.nl