



Medicatieschema voor diabetes patiënten bij gastroscopie

Dit schema kan aangehouden worden bij onderzoeken die tot 12.00 uur plaatsvinden.

Tabletafhankelijke diabetespatiënten

De dag voor het onderzoek:

- Neem uw avonddosering **normaal** in

De dag van het onderzoek:

- Neem uw ochtenddosering tabletten **niet** in. Deze neemt u pas de eerstvolgende maaltijd na het onderzoek in.

Insulineafhankelijke diabetespatiënten

De dag voor het onderzoek houdt u uw normale dosering insuline aan. Behalve de avonddosering. Deze dient u toe volgens onderstaand schema:

Insulinesoort	Tijdstip	Dosering
Kortwerkende insuline (novorapid, actrapid, humalog)	Voor de avondmaaltijd	Gebruikelijke dosering
Langwerkende insuline (levemir, lantus, insulatard)	Voor het slapen gaan	50% van de gebruikelijke dosering
Mix-insuline (novomix, humalogmix)	Voor de avondmaaltijd	75% van de gebruikelijke dosering

Onderstaand een schema met acties bij controle voor het slapen

Tijdstip	Glucosewaarden	Actie
Controle voor de nacht	<4,0 mmol	0,4 dl (=2cm) ranja met water
	<6,0 mmol	2 glazen helder

		vruchtensap (b.v. appelsap)
	Tussen 6,0-8,0 mmol	1 glas helder vruchtensap (b.v. appelsap)
	>8,0 mmol	Goed, geen actie nodig

De dag van het onderzoek

(Neem uw insulinepen mee naar het ziekenhuis!)

Insulinesoort	Tijdstip	Dosering
Kortwerkende insuline (novorapid, actrapid, humalog)	Voor 1 ^e maaltijd na het onderzoek	Gebruikelijke dosering
Bij ochtend gebruikt van Langwerkende insuline (levemir, lantus, insulatard)	Voor 1 ^e maaltijd na het onderzoek	50% van de gebruikelijke dosering (indien voor ontbijt gespoten)
Mix-insuline (novomix, humalogmix)	Voor 1 ^e maaltijd na het onderzoek	50% van de gebruikelijke dosering
Alle soorten insuline	Alle andere maaltijden	Gebruikelijke dosering



Bij gebruik van GLP-1 agonisten:

(Byetta, Bydureon, Victoza, Lyxumia, Trulicity, Xultophy, Ozempic). Deze hoeven niet gestaakt te worden.

Insulinepomp

Maak op de dag van het onderzoek zo nodig gebruik van een tijdelijke basaal stand als de bloedsuikerwaarden laag zijn.

Onderzoek na 12 uur

Heeft u een onderzoek na 12 uur? Neem dan contact op met uw behandelaar voor een aangepast schema.

Neemt u contact op:

Als na het onderzoek klachten optreden, bijvoorbeeld koorts of benauwdheid, neemt u dan direct contact op met de afdeling Endoscopie.

De uitslag:

De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend arts bij de eerst volgende afspraak besproken. De afspraak kan zijn met uw huisarts of de behandelende arts in het ziekenhuis. Wanneer er weefsel is afgenomen, duurt het 5 werkdagen voordat de uitslag bekend is.

Tot slot:

Inzien medische gegevens

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl

Bereikbaarheid afdeling Endoscopie

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met afdeling Endoscopie via 0181-65 83 53.

Raadpleeg onze website voor de actuele tijden.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.